

本品は通常の救急ばんそうこうとは異なりますので、この添付文書をよく読んでからご使用ください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

ケアリーヴTM 治す力TM 防水タイプ 超大判

医療用品 (4) 整形用品 管理医療機器 家庭用創傷パッド JMDN コード 71025000
※この添付文書は超大判 M サイズ、超大判 L サイズ共通のものです。

使用目的又は効果

切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ等の創傷及び
軽度の熱傷(やけど)の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」

形状・構造及び原理等

水に強い低刺激性粘着剤

独自に開発した低刺激性粘着剤を使用。肌
へのやさしさとはがれにくさを実現しました。

防水フィルム

薄くて目立たず、自然な貼り心地の防水フィルムを
使用。コシのある表面フィルム付きで貼りやすい。

キズを早くきれいに治すモイストパッドTM

① モイストヒーリング(湿潤療法)

ハイドロコロイド素材のモイストパッドTMが滲出液
を吸収・保持し、キズを治すのに最適な潤い環境を保
ちます。かさぶたをつくらず、新しい皮ふが早くきれ
いに再生するのを促します。

② キズぐちだけを集中ケア

パッドにのみハイドロコロイド素材を使用。キズの
周囲の健康な皮ふにストレスをかけず、キズの潤いを
保ち、痛みをおさえ、快適にキズぐちを保護します。



キズぐちから出てくる体液(滲出液)に
は、キズを治す成分が含まれています。

規格

製品	テープサイズ	パッドサイズ
超大判 M サイズ	90mm × 108mm	50mm × 70mm
超大判 L サイズ	100mm × 125mm	60mm × 75mm

表面フィルム

特殊形状でかぶれにくい

■ 再使用禁止



禁忌・禁止

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、治癒が遅れたり、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の部位には使用しないでください。
 - 感染したキズ(キズの周囲が赤い、熱・はれがある、ズキズキした痛みが続く、膿を持つ等の異常がある)。
 - 感染を起こす可能性のあるキズ(深いキズ、咬まれたキズ、ガラス・木片・砂・ほこりなどの異物が入っているキズ、受傷してから時間が経って、かさぶたができていたり、滲出液や血液が乾いて固まっているキズ)。
 - 深いさしキズ、筋肉・骨・腱が見えるような深いキズ。
 - にきび、湿疹・発赤、虫さされ、皮膚炎など。
 - 目の周囲、粘膜。
 - キズの周囲の皮ふに別の疾患がある場合。
- 個包装を開封した状態で長時間放置しないでください。一度使用したものを再使用しないでください。本品を切って使用しないでください。
- パッドサイズより大きなキズには使用しないでください。キズの大きさより大きいパッドサイズの製品を使用してください。
- 殺菌・消毒剤や軟膏、クリーム等と本品を併用しないでください。軟膏等をキズぐちに塗った場合は、水道水などでしっかり洗い流し、水気をふきとってから、本品を使用してください。
- 患部が汚れたまま本品を使用しないでください。キズぐちの汚れを水道水などで洗い落とし、水気をふきとってからご使用ください。
- はがすときは、出血させたり、再生した皮ふを取り除いたり、皮ふを傷めたりしないようご注意ください。
- 3歳未満の乳幼児には使用しないでください。
- 滲出液がもれたり、テープがはがれたりした場合は、そのまま貼り続けしないでください。その場合は本品をはがし、キズを水道水などでよく洗浄した後、新しいものに貼り替えてください。
- パッドが水などで濡れたり、汚れたりした場合は、そのまま貼り続けず、新しいものに貼り替えてください。
- 使用時に個包装に汚損、破損、水濡れなどがみられた場合には使用しないでください。
- 授乳キズには使用しないでください。乳児が誤飲する恐れがあります。
- 個包装紙に天然ゴムラテックスを使用しています。ラテックスアレルギーの方はご注意ください。

相談すること


- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 糖尿病や血行障害の治療を受けている人。
 - アレルギー体質の人や、薬やばんそうこうなどで発疹などの過敏症状を経験したことがある人。
 - 強い倦怠感を感じていたり、発熱があるなど全身状態がよくない人。
- 次の場合は、使用を直ちに中止し、医師の診断を受けてください。
 - 本品の使用により、キズの悪化、化膿、感染(キズの周囲が赤い、ズキズキした痛みがある、膿を持っている、熱やはれ等の異常が認められる)、キズの治りが悪い等の症状があらわれた場合。
 - 本品の使用により、発疹・発赤、水疱、皮ふはく離、かゆみ等を生じた場合。
 - 貼り替えながら、数日間使用しても症状がよくなりない場合。
 - 本品をはがしたときに、臭くて粘りのある淡黄色の膿のようなものがあり、その周囲が赤くはれている場合。
 - アレルギー様の症状があらわれた場合。

- 1) 以下の使い方を守ってご使用ください。
- 2) 小児に使用させる場合は、保護者の監督のもとに使用させてください。
- 3) 本品は外用ですので、内服しないでください。
- 4) はがれやすくなるので、貼り直しはしないでください。

貼る前に

- キズを水道水などでよく洗い、水気を清潔なティッシュペーパーやタオル等でふきとってからご使用ください。（殺菌・消毒剤や軟膏、クリーム等は本品と併用しないでください）
- 表面の **してはいけないこと**、**相談すること** をよくお読みください。

貼り方



貼っている間

貼ってしばらくすると、キズぐちから出てくる^{しんじゅつえき}滲出液をパッドが吸収・保持し、その部分がゲル化し白くふくらみます。キズが治るにしたがい、^{しんじゅつえき}滲出液の分泌が減ってきます。そのため貼り替えるたびに、その白いふくらみが小さくなります。滲出液がなくなった時点で本品の使用を終了し、その後は必要に応じてケアリーヴTM等の救急ばんそうこうをご使用ください。

- 少なくとも2～3日に1回は本品をはがしてキズを観察し、感染を示す症状がないことを確認してください。観察後は新しいものに貼り替えてください。ただし、感染の症状が認められた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 本品のパッドは粘着性があり、滲出液を吸収すると白くふくらみます。吸収量によっては、パッドの表面がでこぼこしたり、白くふくらまない場合もあります。また、パッドに黒っぽい粒や泡状の白い斑点(ムラ)が見られることがあります。成分由来のもので品質上問題ありません。
- シャワーや入浴の前に、全面が皮ふに密着して水が入らないことを確認してください。特に関節部位に貼る場合は、シワが入りやすいので注意してください。
- 異常がみられた場合は、すぐにはがしてください。

はがすとき

- はがすときは、皮ふを傷めないよう、体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。
- はがしたときに膿のようなものがないか確認してください。膿は淡黄色で粘りがあり臭いがします。膿のようなものが認められた場合には本品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。ただし、透明で臭いがないゲル状の場合は、キズぐちからの滲出液を本品が吸収したもので、水道水などで洗い流してください。
- テープをはがしにくいときやパッドがキズぐちに残った場合は、ぬるま湯や水道水などで洗いながらはがしてください。

保管方法及び有効期間等

- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい、小児の手のとどかない所に保管してください。
- 外袋の裏面に使用期限を表示しています。使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

【製造販売・発売元】 二チバン株式会社 〒102-8811 東京都千代田区麹町 5-1

【お問合せ窓口】 二チバン株式会社 お客様相談室 電話 0120-377-218

受付時間：9:00～12:00、13:00～16:00(土・日・祝日を除く)